



1. Considera, num referencial o.n.  $Oxyz$ , o plano  $\alpha$ , definido por  $4x - z + 1 = 0$ . Seja  $r$  uma reta perpendicular ao plano  $\alpha$ .

Qual das condições seguintes pode definir a reta  $r$ ?

(A)  $(x, y, z) = (0, 0, -1) + k(4, 1, 0), k \in \mathbb{R}$

(B)  $x = 4 \wedge z = -1$

(C)  $(x, y, z) = (3, 0, 0) + k(1, 0, 4), k \in \mathbb{R}$

(D)  $(x, y, z) = (3, 1, 0) + k(4, 0, -1), k \in \mathbb{R}$

Se a reta  $r$  é perpendicular ao plano  $\alpha$ , então um vetor diretor de  $r$  é colinear ao vetor normal de  $\alpha$ , ou seja,  $(4, 0, -1)$ .

Assim, uma equação vetorial de  $r$  é:

$$(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3) + k(4, 0, -1), k \in \mathbb{R}$$

Assim, a opção correta é a (D).

2. Considera, num referencial o.n.  $Oxyz$ , o ponto  $A$ , de coordenadas  $(1, 0, 3)$ , e o plano  $\alpha$ , definido por  $3x + 2y - 4 = 0$ . Seja  $\beta$  um plano perpendicular ao plano  $\alpha$  e que passa em  $A$ .

Qual das condições seguintes pode definir o plano  $\beta$ ?

(A)  $2x + 2y - 3 = 0$

(B)  $2x - 3y - z + 1 = 0$

(C)  $2x - 3y + z = 0$

(D)  $3x + 2y = 0$

Um vetor normal a  $\alpha$  é  $\vec{u}(3, 2, 0)$ , pelo que as alternativas (A) e (D) ficam descartadas (já que os vetores normais a esses planos são colineares a  $\vec{u}$ ).

Um vetor perpendicular a  $\vec{u}$  é  $(2, -3, 0)$  (vetor normal aos planos de (B) e de (C) mas o ponto  $A$  pertence ao plano de (B) ( $2 \times 1 - 0 - 3 + 1 = 0$ ) e não pertence ao plano de (C) ( $2 \times 1 - 0 + 3 = 5 \neq 0$ )).

Assim, a opção correta é a (B).

3. Considera, num referencial o.n.  $Oxyz$ , o ponto  $A$ , de coordenadas  $(2, 0, 3)$ , e o plano  $\alpha$ , definido por  $x - y - 2z = 3$ . Seja  $r$  a reta ao perpendicular ao plano  $\alpha$  e que passa em  $A$ .  
Qual das condições pode definir a reta  $r$ ?

- (A)  $(x, y, z) = (-2, 0, -1) + k(1, 0, 1), k \in \mathbb{R}$   
 (B)  $(x, y, z) = (5, -3, -3) + k(-1, 1, 2), k \in \mathbb{R}$   
 (C)  $(x, y, z) = (1, -1, -2) + k(2, 0, 3), k \in \mathbb{R}$   
 (D)  $(x, y, z) = (2, 0, 3) + k(1, -1, 1), k \in \mathbb{R}$

O vetor  $\vec{u}(1, -1, -2)$ , normal a  $\alpha$ , e o vetor diretor da reta têm de ser colineares. Assim, as outras opções ficam descartadas (a reta de (A) apresenta o vetor  $(1, 0, 1)$ , a reta de (C) apresenta o vetor  $(2, 0, 3)$  e a de (D) apresenta o vetor  $(1, -1, 1)$ ).


**Observação:** o ponto  $A(2, 0, 3)$  pertence a  $r$ , pois

$$-2 + 5 = 0 + 3 = \frac{3 + 3}{2}.$$

Assim, a opção correta é a (B).

Os segmentos de reta  $[AB]$  e  $[BC]$  são lados consecutivos de um hexágono regular de perímetro 12.  
Qual é o valor do produto escalar  $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$ ?


- (A)  $-3$                       (B)  $-2$                       (C)  $2$                       (D)  $3$



$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 2 \times 2 \times \cos 120^\circ = -2$$

Assim, a opção correta é a (B).

4. Na figura está representado, num referencial o.n.  $xOy$ , um triângulo equilátero  $[ABC]$ .



Sabe-se que:

- o ponto  $A$  tem ordenada positiva;
- os pontos  $B$  e  $C$  pertencem ao eixo  $Ox$ ;
- o ponto  $B$  tem abcissa 1 e o ponto  $C$  tem abcissa maior do que 1.

Qual é a equação reduzida da reta  $AB$  ?


- (A)  $y = \sqrt{2}x - \sqrt{2}$   
 (B)  $y = \sqrt{2}x + \sqrt{2}$   
 (C)  $y = \sqrt{3}x + \sqrt{3}$   
 (D)  $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$

A ordenada na origem da reta  $AB$  é negativa e, como  $[AB]$  é um dos lados de um triângulo equilátero, o declive é  $\text{tg}60^\circ = \sqrt{3}$ .

Assim, a opção correta é a (D).

5. Considera, num referencial  $xOy$ , a circunferência definida pela equação  $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ .  
 Esta circunferência intersesta o eixo  $Ox$  em dois pontos. Destes dois pontos, seja  $A$  o que tem abcissa positiva.  
 Seja  $r$  a reta tangente à circunferência no ponto  $A$ .  
 Qual é a equação reduzida da reta  $r$ ?

- (A)  $y = x + 1$
- (B)  $y = x - 1$
- (C)  $y = 2x + 2$
- (D)  $y = 2x - 2$



Seja  $a$  a abcissa de  $A$ . Então:

$$a^2 + (0 - 1)^2 = 2 \Leftrightarrow a^2 = 1 \rightarrow a = 1 \rightarrow A(1, 0)$$

As retas  $AC$  e  $r$  são perpendiculares, logo

$$m_r = -\frac{1}{m_{AC}}.$$

Ora,  $\overrightarrow{AC} = (-1, 1)$ , pelo que  $m_{AC} = -1$ , logo  $m_r = 1$ .

Atendendo a que  $A$  pertence a  $r$ , tem-se:

$$y - 0 = 1(x - 1) \Leftrightarrow y = x - 1$$

Assim, a opção correta é a (B).

Soluções

1. *D*      2. *B*      3. *B*      4. *B*      5. *D*      6. *B*