


1. Na figura, está representado, em referencial o.n. $Oxyz$, um cone reto de vértice V e base de centro no ponto A .



Sabe-se que:

- o ponto V pertence ao eixo Oz , e o ponto A pertence ao eixo Oy ;
- a base do cone tem raio 3 e está contida no plano definido por $4x - 3y = 16$.

- 1.1. Qual das seguintes equações define um plano perpendicular ao plano que contém a base do cone e que passa no ponto de coordenadas $(1, 2, -1)$?

- (A) $4y - 3z = 11$ (B) $3x + 4y + z = 10$
(C) $3y + 4z = 8$ (D) $x + 3y + 4z = 3$

- 1.2. Resolva este item sem recorrer à calculadora.

Determine o volume do cone.

Exame 2022, 1.ª fase

2. Na figura seguinte, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, um cubo $[ABCDEFGH]$ em que cada aresta é paralela a um dos eixos coordenados.


Sabe-se que:

- o vértice B tem coordenadas $(0,2,4)$
- o vetor \overrightarrow{BE} tem coordenadas $(2,2,-2)$
- a aresta $[BG]$ é paralela ao eixo Oz

Seja α o plano que passa por G e é perpendicular à reta OE

Sejam P , Q e R os pontos de α que pertencem aos eixos coordenados.

Determine o volume da pirâmide $[OPQR]$



Exame 2020, época especial

3. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, o cubo $[ABCDEFGH]$ (o ponto H não está representado na figura).


Sabe-se que:

- o ponto A tem coordenadas $(7,1,4)$
- o ponto G tem coordenadas $(5,3,6)$
- a reta AE é definida pela equação vetorial $(x,y,z) = (7,1,4) + k(3,-6,2), k \in \mathbb{R}$

Resolva o item seguinte sem recorrer à calculadora.

Determine uma equação do plano EFG

Apresente essa equação na forma $ax + by + cz + d = 0$




Exame 2020, 2.ª fase

4. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, um cilindro reto.

Sabe-se que:

- o ponto A pertence ao eixo Oy e é o centro de uma das bases do cilindro, e o ponto B pertence ao eixo Ox e é o centro da outra base;
- o ponto C pertence à circunferência de centro B que delimita uma das bases do cilindro;
- o plano ABC é definido pela equação $3x + 4y + 4z - 12 = 0$



Resolva os itens seguintes. sem recorrer à calculadora.

- 3.1. Determine \overline{BC} , sabendo que o volume do cilindro é igual a 10π
- 3.2. Seja P o ponto de coordenadas $(3,5,6)$

Determine as coordenadas do ponto do plano ABC que se encontra mais próximo do ponto P

Exame 2020, 1.ª fase

5. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$,

- o plano α , de equação $2x + 3y - z - 9 = 0$
- a reta r , de equação vetorial $(x,y,z) = (1,2,1) + k(0,1,5), k \in \mathbb{R}$

- 4.1. Seja A o ponto da reta r cuja ordenada é igual a 4

Determine uma equação do plano que é paralelo ao plano α e que passa pelo ponto A

Apresente essa equação na forma $ax + by + cz + d = 0$

- 4.2. Seja P o ponto de intersecção da reta r com o plano α

Determine as coordenadas do ponto P

Exame 2019, época especial

6. Na figura seguinte, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, um paralelepípedo retângulo $[ABCDEFGH]$


Sabe-se que:

- o vértice A pertence ao eixo Ox e o vértice B pertence ao eixo Oy
- o vértice C tem coordenadas $(0,3,6)$ e o vértice G tem coordenadas $(6,11,0)$
- o plano ABC é definido pela equação $3x+4y-12=0$

5.1. Determine o volume do paralelepípedo $[ABCDEFGH]$

5.2. Seja P o ponto de coordenadas $(1, -4,3)$, e seja r a reta que passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano ABC

Determine as coordenadas do ponto de intersecção da reta r com o plano ABC



Exame 2019, 2.ª fase


7. Na figura ao lado, está representada, num referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide quadrangular regular $[ABCDV]$

Os vértices A e C têm coordenadas $(2,1,0)$ e $(0, -1,2)$, respetivamente.

O vértice V tem coordenadas $(3, -1,2)$

Determine uma equação do plano que contém a base da pirâmide.

Apresente essa equação na forma $ax + by + cz + d = 0$



Exame 2019, 1.ª fase

8. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, a superfície esférica de equação

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 10$$

Seja P o ponto da superfície esférica de abcissa 1, ordenada 3 e cota negativa.

Seja r a reta de equação vetorial $(x,y,z) = (-1,0,3) + k(4,1,-2)$, $k \in \mathbb{R}$

Determine uma equação do plano que passa no ponto P e é perpendicular à reta r


Apresente essa equação na forma $ax + by + cz + d = 0$

Exame 2018, 2.ª fase

9. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, um prisma hexagonal regular.

Sabe-se que:

- $[PQ]$ e $[QR]$ são arestas de uma das bases do prisma;
- $\overline{PQ} = 4$
- o plano PQR tem equação $2x + 3y - z - 15 = 0$
- uma das arestas laterais do prisma é o segmento de reta $[PS]$, em que S é o ponto de coordenadas $(14,5,0)$



Determine a área lateral do prisma.

Apresente o resultado arredondado às décimas.


Se, em cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conserve, no mínimo, três casas decimais.

Exame 2018, 1.ª fase

10. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, um cilindro de revolução de altura 3

Sabe-se que:

- o ponto A tem coordenadas $(1,2,0)$ e é o centro da base inferior do cilindro, a qual está contida no plano xOy
- o ponto B tem coordenadas $(1,3,0)$ e pertence à circunferência que delimita a base inferior do cilindro;
- o ponto C é o centro da base superior do cilindro.




Determine as coordenadas do ponto de intersecção da reta BC com o plano xOz

Exame 2017, época especial

11. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, o cubo $[ABCDEFGH]$

Sabe-se que:

- a face $[ABCD]$ está contida no plano xOy
- a aresta $[CD]$ está contida no eixo Oy
- o ponto D tem coordenadas $(0,4,0)$
- o plano ACG é definido pela equação $x + y - z - 6 = 0$



Verifique que o vértice A tem abcissa igual a 2

Exame 2017, 2.ª fase


12. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, o prisma quadrangular regular $[OPQRSTU]$

Sabe-se que:

- a face $[OPQR]$ está contida no plano xOy
- o vértice Q pertence ao eixo Oy e o vértice T pertence ao eixo Oz
- o plano STU tem equação $z = 3$

Uma equação do plano PQV é $x + y = 2$

Determine uma equação vetorial que defina a reta TQ



Exame 2017, 1.ª fase


13. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, o prisma quadrangular regular $[OABCDEFG]$

Sabe-se que:

- os pontos C , A e E pertencem aos eixos coordenados Ox , Oy e Oz , respetivamente;
- o ponto A tem coordenadas $(0,2,0)$
- o plano OFB é definido pela equação $3x + 3y - z = 0$

12.1. Determine uma equação do plano paralelo ao plano OFB que passa no ponto D

12.2. Defina a reta OB por uma equação vetorial.



Exame 2016, época especial

14. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, o plano α definido pela equação $3x + 2y + 4z - 12 = 0$.
Seja C o ponto de coordenadas $(2,1,4)$

Escreva uma equação vetorial da reta perpendicular ao plano α que passa no ponto C


Exame 2016, 2.ª fase

15. Na figura ao lado, está representada, num referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide quadrangular regular $ABCDV$

Sabe-se que:

- a base $[ABCD]$ da pirâmide é paralela ao plano xOy
- o ponto A tem coordenadas $(-1,1,1)$
- o ponto C tem coordenadas $(-3,3,1)$
- o plano BCV é definido pela equação $3y + z - 10 = 0$

Determine as coordenadas do ponto V



Exame 2016, 1.ª fase

16. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, o plano β definido pela condição $2x - y + z - 4 = 0$

Considere o ponto $P(-2,1,3a)$, sendo a um certo número real.

Sabe-se que a reta OP é perpendicular ao plano β , sendo O a origem do referencial.

Determine o valor de a

Exame 2015, época especial


17. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, o poliedro $[NOPQRSTUV]$ que se pode decompor num cubo e numa pirâmide quadrangular regular.

Sabe-se que:

- o vértice P pertence ao eixo Ox
- o vértice N pertence ao eixo Oy
- o vértice T pertence ao eixo Oz
- o vértice R tem coordenadas $(2,2,2)$
- o plano PQV é definido pela equação $6x + z - 12 = 0$

16.1. Determine as coordenadas do ponto V

16.2. Escreva uma equação cartesiana do plano que passa no ponto P e é perpendicular à reta OR



Exame 2015, 2.ª fase

18. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, os pontos $A(0,0,2)$ e $B(4,0,0)$
 Considere o plano α de equação $x - 2y + z + 3 = 0$

Escreva uma equação do plano que passa no ponto A e é paralelo ao plano α

Exame 2015, 1.ª fase

19. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, o ponto A , de coordenadas $(1,0,3)$, e o plano α , definido por $3x + 2y - 4 = 0$

Seja β um plano perpendicular ao plano α e que passa pelo ponto A

Qual das condições seguintes pode definir o plano β ?

- (A) $3x + 2y - 3 = 0$ (B) $2x - 3y - z + 1 = 0$
 (C) $2x - 3y + z = 0$ (D) $3x + 2y = 0$


Exame 2014, 2.ª fase

20. Na figura ao lado, está representada, num referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide quadrangular regular $[ABCDV]$, cuja base está contida no plano xOy e cujo vértice V tem cota positiva.

O ponto P é o centro da base da pirâmide.

Admita que:

- $\overline{AV} = 10$
- o vértice A pertence ao eixo Ox e tem abcissa igual a 6
- o vértice V tem abcissa e ordenada iguais a 6




- 19.1. Mostre que o vértice V tem cota igual a 8
 19.2. Seja M o ponto médio da aresta $[BV]$
 Determine uma equação vetorial da reta CM
 19.3. Determine uma equação cartesiana do plano que passa no ponto P e que é perpendicular à aresta DV

Teste Intermédio 12.º ano, abril 2014

21. Na figura ao lado, em cima, está representada, num referencial o.n. $Oxyz$, parte do plano ABC , de equação $x + y + 2z = 12$

Tal como a figura sugere, A , B e C são os pontos de interseção deste plano com os eixos coordenados.

Determine uma equação cartesiana do plano que passa no ponto $D(1,2,3)$ e é paralelo ao plano ABC



Teste Intermédio 11.º ano, março 2014

22. Na figura seguinte, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$, o cubo $[ABCDEFGH]$ (o ponto E não está representado na figura).


Sabe-se que:

- o ponto F tem coordenadas $(1,3,-4)$
- o vetor \vec{FA} tem coordenadas $(2,3,6)$

21.1. Escreva uma condição cartesiana que defina o plano FGH

21.2. Sabe-se ainda que a equação $6x + 2y - 3z + 25 = 0$ define o plano HCD

Determine, sem recorrer à calculadora, as coordenadas do ponto E (vértice do cubo, não representado na figura).



Teste Intermédio 11.º ano, março 2013

23. Seja a um número real.

Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, a reta s e o plano β definidos, respetivamente, por

$$(x,y,z) = (-1,0,3) + k(1,1,-1), k \in \mathbb{R} \text{ e } 3x + 3y + az = 1$$

Sabe-se que a reta s é paralela ao plano β

Qual é o valor de a ?

- (A) -3 (B) 1 (C) 3 (D) 6


Teste Intermédio 11.º ano, fevereiro 2012

24. Na figura ao lado, está representada, num referencial o.n. $Oxyz$, a pirâmide quadrangular regular $[ABCDE]$

Seja F o centro da base da pirâmide.

Sabe-se que:

- o ponto F tem coordenadas $(-2,1,-1)$
- o vetor \vec{FE} tem coordenadas $(-1,2,2)$
- a reta EA é definida pela condição $(x,y,z) = (-3,3,1) + k(1,-5,1), k \in \mathbb{R}$



Mostre que o plano ABC pode ser definido pela equação $x - 2y - 2z + 2 = 0$


Teste Intermédio 11.º ano, fevereiro 2012

25. Na figura ao lado, está representado, em referencial o.n. $Oxyz$, o poliedro $[VNOPQRST]$, que se pode decompor num cubo e numa pirâmide quadrangular regular.

Sabe-se que:

- a base da pirâmide coincide com a face superior do cubo e está contida no plano xOy
- o ponto P pertence ao eixo Ox
- o ponto U tem coordenadas $(4, -4, -4)$
- o plano QTV é definido pela equação $5x + 2y + 2z = 12$

- 24.1. Escreva uma condição cartesiana que defina o plano paralelo ao plano QTV e que passa na origem do referencial.
 24.2. Determine o volume do poliedro $[VNOPQRST]$



Teste Intermédio 11.º ano, janeiro 2011


26. Na figura ao lado, está representada, num referencial o.n. $Oxyz$, parte de um plano ABC

Cada um dos pontos A , B e C pertence a um eixo coordenado.

O plano ABC é definido pela equação $6x + 3y + 4z = 12$

Seja r a reta que passa no ponto A e é perpendicular ao plano ABC

Determine uma equação vetorial da reta r




Teste Intermédio 11.º ano, maio 2010

27. Na figura seguinte, está representada, num referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide quadrangular regular $[ABCDV]$ cuja base está contida no plano xOy

Sabe-se que:

- o ponto A pertence ao eixo Ox
- o ponto B tem coordenadas $(5,3,0)$
- o ponto V pertence ao plano de equação $z = 6$
- $6x + 18y - 5z = 24$ é uma equação do plano ADV

- 26.1. Determine o volume da pirâmide.
 26.2. Seja S o ponto de coordenadas $(-1, -15, 5)$
 Seja r a reta que contém o ponto S e é perpendicular ao plano ADV
 Averigue se a reta r contém o ponto B



Teste Intermédio 11.º ano, janeiro 2010


28. Na figura ao lado está representado um referencial o.n. $Oxyz$

Cada um dos pontos A , B e C pertence a um eixo coordenado.

O ponto P pertence ao plano ABC .

O ponto P desloca-se no plano ABC , de tal modo que é sempre vértice de um prisma **quadrangular regular**, em que os restantes vértices pertencem aos planos coordenados.

O plano é definido pela equação $x + 2y + 3z = 9$



- 27.1. Seja a a abcissa do ponto P ($a \in]0,3[$)
 Mostre que o volume do prisma é dado, em função de a , por $3a^2 - a^3$
- 27.2. Seja r a reta que contém o ponto A e é perpendicular ao plano ABC .
 Determine uma equação vetorial da reta r .


Teste Intermédio 11.º ano, maio 2009

29. Na figura seguinte está representado, em referencial o.n. $Oxyz$, um cone de revolução.

Sabe-se que:

- a base do cone está contida no plano α de equação $x + 2y - 2z = 11$
- o vértice V do cone tem coordenadas $(1,2,6)$
- o ponto C é o centro da base do cone

- 28.1. Determine uma equação do plano γ que contém o vértice do cone e que é paralelo ao plano α
- 28.2. Seja β o plano definido pela equação $2x - y + z = 3$
 Averigue se os planos α e β são perpendiculares.



Teste Intermédio 11.º ano, janeiro 2009


30. Na figura seguinte está representada, em referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide quadrangular.

Admita que o vértice E se desloca no semieixo positivo Oz , entre a origem e o ponto de cota 6, nunca coincidindo com qualquer um destes dois pontos.

Com o movimento do vértice E , os outros quatro vértices da pirâmide deslocam-se no plano xOy , de tal forma que:

- a pirâmide permanece sempre regular
- o vértice A tem sempre abcissa igual à ordenada
- sendo x a abcissa de A e sendo c a cota de E , tem-se sempre

$$x + c = 6$$



Admita que $x = 1$. Indique, para este caso, as coordenadas dos pontos A , B e E e determine uma equação cartesiana do plano ABE .

Teste Intermédio 11.º ano, maio 2008

31. Num referencial o. n. $Oxyz$, sejam α e β os planos definidos pelas equações:

$$\alpha : x + y - z = 1 \quad \text{e} \quad \beta : 2x + 2y - 2z = 1$$

A intersecção dos planos α e β é

- (A) o conjunto vazio (B) um ponto (C) uma reta (D) um plano

Teste Intermédio 11.º ano, janeiro 2008

32. Considere, em referencial o.n. $Oxyz$, o ponto $P(0,4,3)$

Seja α o plano que contém o ponto P e é perpendicular à reta de equação vetorial

$$(x,y,z) = (0,1, -3) + k(1,0,2), k \in \mathbb{R}$$

Determine a área da secção produzida pelo plano α na esfera definida pela condição

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 4)^2 \leq 3$$

Sugere-se que:

- Determine uma equação do plano α .
- Mostre que o centro da esfera pertence ao plano α .
- Atendendo ao ponto anterior, determine a área da secção.

Teste Intermédio 11.º ano, maio 2007


33. Na figura ao lado está representado, em referencial o.n. $Oxyz$, um sólido formado por um paralelepípedo retângulo $[ABCDEFGH]$ e uma pirâmide $[ABCDV]$.

A base $[EFGH]$ do paralelepípedo está contida no plano xOy e a base da pirâmide $[ABCD]$ coincide com a face superior do paralelepípedo.

A aresta $[GF]$ está contida no eixo Oy .

O ponto A tem coordenadas $(1,1,1)$ e o ponto H tem coordenadas $(1, -2,0)$

Mostre que uma equação do plano AGH é $y - 3z + 2 = 0$



Exame 2001, prova de reserva

34. Considere duas retas distintas, r e s , perpendiculares a um mesmo plano.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira ?

- (A) r é perpendicular a s (B) r e s são concorrentes, mas não perpendiculares
 (C) r é paralela a s (D) r e s não são coplanares

Teste Intermédio 12.º ano, março 2012

35. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, um plano α de equação $x + 2y - z = 2$
 Seja β o plano que é paralelo a α e que contém o ponto $(0,1,2)$

Qual das condições seguintes é uma equação do plano β ?

- (A) $x + 2y - z = 1$ (B) $x + z = 2$ (C) $-x - 2y + z = 0$ (D) $x - y + z = 1$


Exame 2001, 2.ª fase

36. Na figura ao lado está representado, em referencial o.n. $Oxyz$, um cubo.

- O vértice O é a origem do referencial
- O vértice A pertence ao eixo Ox
- O vértice G pertence ao eixo Oy
- O vértice E pertence ao eixo Oz
- H é o centro da face $[OGFE]$
- Uma equação do plano que contém os pontos D , B e H é $x + y = 10$

Qual é a medida da aresta do cubo?

- (A) 5 (B) 10 (C) $5\sqrt{2}$ (D) $10\sqrt{2}$




Exame 2001, 1.ª fase

37. Na figura seguinte está representada, em referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide quadrangular regular.

- O vértice O é a origem do referencial
- O vértice P pertence ao eixo Oz
- O vértice R pertence ao plano xOy
- O vértice V tem coordenadas $(-2,11,5)$

Uma equação vetorial da reta que contém a altura da pirâmide é $(x,y,z) = (7, -1,5) + k(6, -8,0), k \in \mathbb{R}$

- 36.1. Mostre que a base da pirâmide está contida no plano de equação $3x - 4y = 0$
- 36.2. Justifique que o centro da base da pirâmide é o ponto de coordenadas $(4,3,5)$




Exame 2000, 2.ª fase

38. Num referencial o.n. $Oxyz$, considere um paralelepípedo retângulo $[OPQRSTUVWXYZ]$

Os pontos P , R e V pertencem aos semi-eixos positivos Ox , Oy e Oz , respetivamente.

O quadrilátero $[ABCD]$ é a secção obtida no paralelepípedo pelo plano de equação $2x + 3y + z = 22$, que é perpendicular à reta OT

O ponto R tem ordenada 6



- 38.1. Justifique que o ponto T tem coordenadas $(4,6,2)$
- 38.2. Determine uma equação do plano que é paralelo ao plano ABC e que contém o ponto Q

Exame 2000, prova militares

39. Num referencial o.n. $Oxyz$, a condição

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 25 \wedge x = y$$

define

- (A) uma circunferência
- (B) um ponto
- (C) um segmento de reta
- (D) o conjunto vazio


Exame 2000, prova militares

40. Na figura ao lado está representado em referencial o.n. $Oxyz$, um cone cuja base está contida no plano yOz e cujo vértice pertence ao semieixo positivo Ox

A base tem raio 3 e centro em O , origem do referencial.

A reta r , de equação $(x,y,z) = (0,3,0) + k(3, -1,0), k \in \mathbb{R}$, contém uma geratriz do cone.

Determine uma equação do plano que contém o vértice do cone e é perpendicular à reta r




Exame 2000, época especial

41. Na figura ao lado está representada, em referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide quadrangular regular.

- A base da pirâmide é paralela ao plano xOy
- O ponto A tem coordenadas $(8,8,7)$
- O ponto B pertence ao plano yOz
- O ponto C pertence ao eixo Oz
- O ponto D pertence ao plano xOz
- O ponto E é o centro da base da pirâmide
- O vértice V da pirâmide pertence ao plano xOy

Seja α o plano que contém o ponto E e que é paralelo ao plano AVB

Mostre que o eixo Ox está contido no plano α



Exame 2000, época especial

42. Num referencial o.n. $Oxyz$, considere o plano α , de equação $x = y$

Qual das seguintes pontos é o simétrico do ponto $P(1,0,0)$, em relação ao plano α ?

- (A) $A(-1,0,0)$ (B) $B(1, -1,0)$ (C) $C(1,0,1)$ (D) $D(0,1,0)$

Exame 2000, 1.ª fase

43. Considere dois planos concorrentes α e β
 Sejam \vec{a} e \vec{b} vetores normais aos planos α e β , respetivamente.
 Seja \vec{r} um vetor com a direção da reta de interseção dos planos α e β

Qual das afirmações seguintes é verdadeira?

- (A) \vec{r} é paralelo a \vec{a} e \vec{r} é paralelo a \vec{b} (B) \vec{r} é paralelo a \vec{a} e \vec{r} é perpendicular a \vec{b}
 (C) \vec{r} é perpendicular a \vec{a} e \vec{r} é paralelo a \vec{b} (D) \vec{r} é perpendicular a \vec{a} e \vec{r} é perpendicular a \vec{b}

Exame 2000, 1.ª fase

44. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, dois planos concorrentes, de equações

$$x - y + 3z = 1 \quad \text{e} \quad x + y - 7z = 7$$

Seja r a reta de intersecção dos dois planos.
 Qual dos pontos seguintes pertence à reta r ?

- (A) (5,5,0) (B) (1,0,0) (C) $C(0,0, -1)$ (D) $D(4,3,0)$

Exame 1999, prova militares

45. Considere, num referencial o. n. $Oxyz$, os pontos $A(2,3,10)$ e $B(10,13,25)$
 Um tiro é disparado de A , de tal forma que o projétil passa pelo ponto B
 Pretende-se atingir um alvo situado no ponto $C(98,123,190)$ e sabemos que, se o projétil seguir uma trajetória retilínea, o alvo é atingido.

Justifique que existe um e um só plano α que contém a origem do referencial e os pontos A, B e C
 Averigue se esse plano é perpendicular ao plano xOy

Exame 1999, prova militares


46. Na figura ao lado, está representado, num referencial o.n. $Oxyz$

Sabe-se que:

- $[ABCD]$ é uma face do cubo
- $[EFGH]$ é a face oposta à face $[ABCD]$
 (o ponto H não está representado na figura)
- $[AE]$, $[BF]$, $[CG]$ e $[DH]$ são quatro arestas do cubo
- O ponto A tem coordenadas $(3,5,3)$
- O ponto D tem coordenadas $(-3,3,6)$
- O ponto E tem coordenadas $(1,2, -3)$

O ponto P é o ponto de intersecção do eixo Oz com a face $[ABCD]$

Determine as coordenadas do ponto P



Exame 1999, época especial

47. Sejam α e β dois planos perpendiculares.
Qual das afirmações seguintes é verdadeira?
- (A) Qualquer reta paralela a α é paralela a β
- (B) Qualquer reta paralela à intersecção de α e β é paralela a β
- (C) Qualquer reta perpendicular a α é perpendicular a β
- (D) Qualquer reta perpendicular à intersecção de α e β é perpendicular a β

Exame 1999, 1.ª fase


48. Na figura ao lado está representado um cubo, em referencial o.n. $Oxyz$

Sabe-se que:

- a face $[OPQR]$ está contida no plano xOy
- a face $[OSVR]$ está contida no plano xOz
- a face $[OSTP]$ está contida no plano yOz
- uma equação do plano VTQ é $x + y + z = 6$

47.1. Mostre que o volume do cubo é 27

- 47.2. Seja α o plano que contém o ponto S e é paralelo ao plano VTQ
Prove que a reta RP está contida em α




Exame 1999, 1.ª fase

49. Na figura seguinte está representado, em referencial o.n. $Oxyz$, um cone de revolução.

Sabe-se que:

- A base do cone está contida no plano xOy e tem o seu centro na origem do referencial
- $[AC]$ e $[BD]$ são diâmetros da base
- O ponto A pertence ao semieixo positivo Ox
- O ponto B pertence ao semieixo positivo Oy
- O vértice V pertence ao semieixo positivo Oz

Sabendo que uma equação do plano ABV é $4x + 4y + 3z = 12$, mostre que o comprimento do raio da base é 3 e a altura do cone é 4




Exame 1999, 1.ª fase

50. Num referencial o.n. $Oxyz$, considere o plano α , de equação $x + y = 4$
 O plano α é
- (A) paralelo ao plano xOy (B) perpendicular ao plano xOy
 (C) paralelo ao eixo Ox (D) perpendicular ao eixo Ox

Exame 1999, prova modelo

51. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$
- o ponto $A(10,0,0)$
 - o ponto $B(0,2,1)$
 - o ponto $C(0,5,0)$
 - a reta AB
 - a reta BC

Justifique que as retas AB e BC são coplanares e mostre que o plano α por elas definido admite como equação $x + 2y + 6z = 10$




Exame 1999, prova modelo

52. A figura ao lado representa uma pirâmide quadrangular regular, em referencial o.n. $Oxyz$
- A base da pirâmide é um quadrado contido no plano xOy
 - Os pontos A e C pertencem ao eixo Ox
 - Os pontos B e D pertencem ao eixo Oy
 - O ponto P pertence ao eixo Oz

51.1. Sabendo que uma equação do plano ABP é $2x + 2y + z = 6$, determine o volume da pirâmide.

51.2. Justifique que a reta definida pela condição $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ é perpendicular ao plano ABP e contém a origem do referencial.




Exame 1998, prova militares

Formulário: Volume da Pirâmide = $\frac{1}{3} \times \text{Área da Base} \times \text{Altura}$

56. Na figura abaixo está representada, em referencial o.n. $Oxyz$, uma caixa cilíndrica construída num material de espessura desprezável.
A caixa contém duas bolas encostadas uma à outra e às bases da caixa cilíndrica.

- O cilindro tem uma das bases no plano xOz
- O centro dessa base é o ponto de coordenadas $(3,0,3)$
- A outra base está contida no plano de equação $y = 12$
- As bolas são esferas de raio igual a 3
- Os diâmetros das esferas e das bases do cilindro são iguais
- A superfície esférica correspondente à bola mais afastada do plano tem centro no ponto $(3,9,3)$ e o ponto $(1,8,1)$ pertence a essa superfície esférica.



Escreva uma equação do plano tangente, no ponto $(1,8,1)$, à superfície esférica referida.

Nota: um plano tangente a uma superfície esférica é perpendicular ao raio relativo ao ponto de tangência.

Exame 1998, 1.ª fase

57. Dois planos α e β são estritamente paralelos.
Qual das afirmações seguintes é verdadeira?

- (A) Qualquer reta contida em α é paralela a qualquer reta contida em β
- (B) Há retas contidas em α que intersectam β
- (C) Há retas perpendiculares a α que não são perpendiculares a β
- (D) Dada uma reta contida em α existem em β infinitas retas que lhe são paralelas

Exame 1998, prova modelo


58. Na figura ao lado está representado um cubo, em referencial o.n. $Oxyz$

O vértice O coincide com a origem do referencial.

- O vértice R pertence ao semieixo positivo Ox
- O vértice P pertence ao semieixo positivo Oy
- O vértice S pertence ao semieixo positivo Oz


A abcissa do ponto R é 2

Determine uma equação cartesiana do plano PUV



Exame 1998, prova modelo

59. Na figura ao lado estão representados em referencial o.n. $Oxyz$, um prisma quadrangular regular e uma pirâmide cuja base $[OFGE]$ coincide com a do prisma e está assente no plano xOy . O vértice da pirâmide coincide com o centro da base superior do prisma.



O ponto G tem coordenadas $(4,4,0)$ e o ponto H tem coordenadas $(2,2,6)$

Escreva uma equação cartesiana do plano OEH

Exame 1997, prova militares

60. Indique qual dos pares de equações seguintes define, num referencial o.n. $Oxyz$ um par de planos perpendiculares.

(A) $x + y = 3$ e $x + y = 0$

(B) $-x + y - z = 1$ e $3x + 2y + 2z = 2$

(C) $x = y$ e $z = 0$

(D) $2x + 2y + z = 9$ e $x - 3z = 0$

Exame 1997, 2.ª fase


61. Considere, num referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide regular de base quadrada (ver figura ao lado).

O vértice V da pirâmide pertence ao semieixo positivo Oz e tem cota 6

A base da pirâmide está contida no plano xOy

A aresta $[PQ]$ é paralela ao eixo Oy . O ponto Q tem coordenadas $(2,2,0)$

Mostre que o plano QRV pode ser definido pela equação $3y + z = 6$



Exame 1997, 1.ª fase

